

# POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN

**CONCURSO PÚBLICO  
Nº 001/2022**



**(QOSPM) – MÉDICO – CIRURGIA GERAL**

**Tarde**

**Tipo 1 - BRANCA**

Organizadora:



**INSTITUTO**  
CONSULPLAN

**QUADRO OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR (QOSPM) – MÉDICO – CIRURGIA GERAL****LÍNGUA PORTUGUESA****Violência contra a mulher: uma pandemia que precisamos combater**

A luta pelo fim da violência contra a mulher não é uma empreitada solitária: ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento também dos homens com o enfrentamento a uma situação que, calamitosa, agravou-se sobremaneira durante a pandemia do novo coronavírus. Com o propósito de chamar a atenção para a gravidade do problema, a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” acontece, também neste ano, com o apoio da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Realizada em 150 países por meio da mobilização da sociedade civil, a ação conta a cada ano com maior conscientização e engajamento da população e do poder público brasileiro.

Apesar da diminuição da violência de gênero nas ruas, a violência doméstica e familiar cresceu, apontam dados da terceira edição da pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, realizada pelo Instituto Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência ou agressão em 2020. Ou seja, no último ano, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência física, psicológica ou sexual. Esses números correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, sem considerar a cifra inviabilizada por ausência de denúncia.

A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, a diretora-executiva da Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres, a sul-africana *Phumzile Mlambo-Ngcuka*, afirmou que enfrentamos duas pandemias: uma, sanitária, que nos expôs ao risco de contaminação por uma doença até então desconhecida, e, outra, silenciosa e invisível, de violência doméstica.

O mesmo estudo indica que a ofensa verbal foi o tipo de agressão mais frequente no período analisado: cerca de 13 milhões de brasileiras relataram ter sido xingadas e insultadas no próprio ambiente familiar, enquanto 5,9 milhões passaram por ameaças de violência física, como tapas, empurrões e chutes. O cenário é ainda pior se levarmos em conta que outras questões atravessam o sofrimento dessas cidadãs. Segundo o Datafolha, 46,7% das vítimas de violência desde o início da pandemia também perderam o emprego.

*(Nildete Santana de Oliveira – Francisco Caputo – Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/12/4968165-violencia-contra-a-mulher-uma-pandemia-que-precisamos-combater.html>. Adaptado.)*

**Questão 01**

Considerando a expressão de intenções e pontos de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto, em seu enunciado, permite reconhecer como efeito de sentido:

- A) Certeza.
- B) Garantia.
- C) Exigência.
- D) Necessidade.
- E) Comprovação.

**Questão 02**

De acordo com as ideias apresentadas, pode-se afirmar que há uma relação de comparação estabelecida no que se refere à violência:

- A) Doméstica e familiar.
- B) Física e outros tipos de violência.
- C) Contra a mulher e um tipo de pandemia.
- D) Contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus.
- E) Vista na pandemia e o combate ao novo coronavírus.

**Questão 03**

Contribuindo para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, algumas palavras atuam na organização e progressão dos parágrafos e do texto. Em “*Apesar da diminuição da violência [...] (2º§)*”, a expressão destacada:

- A) Indica uma ressalva que não anula o argumento principal.
- B) Introduce uma nova temática ampliando, assim, a discussão inicial.
- C) Define a execução de uma ação apresentada no primeiro parágrafo.
- D) Esclarece as ideias expressas no parágrafo anterior, ampliando sua compreensão.
- E) Estabelece a continuidade das ideias apresentadas no parágrafo inicial, fazendo uma referência a elas.

**Questão 04**

Considerando a estrutura linguística dos trechos destacados, assinale a afirmativa correta.

- A) O adjetivo “*calamitosa*” (1º§) estabelece corretamente sua concordância com a expressão “*a pandemia do novo coronavírus*”.
- B) Em “[...] *apontam dados da terceira edição [...]*” (2º§), mantém-se a correção gramatical caso a forma verbal “*apontam*” seja substituída por “*aponta-se*”.
- C) Observa-se a possibilidade da oscilação da regra de concordância verbal em “[...] *cerca de 13 milhões de brasileiras relataram [...]*” (4º§), sendo o núcleo do sujeito um substantivo numeral.
- D) Se em “*O mesmo estudo indica [...]*” (4º§) fosse acrescentada a vírgula após “*estudo*”, seguida de “*a mesma informação, a mesma análise*”; a forma verbal “*indica*” permaneceria na terceira pessoa do singular.
- E) A forma verbal “*sofreu*” pode ser substituída por “*sofreram*” em “[...] *uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu [...]*” (2º§), caso haja intenção de conferir ênfase à expressão “*quatro brasileiras*”.

**Questão 05**

Ainda que o termo destacado a seguir seja excluído, a correção gramatical será preservada assim como a coesão e a coerência. Indique o trecho que apresenta tal elemento.

- A) “[...] afirmou que enfrentamos duas pandemias: [...]” (3º§)
- B) “[...] se levamos em conta que outras questões [...]” (4º§)
- C) “[...] apontam dados da terceira edição da pesquisa Visível e invisível: [...]” (2º§)
- D) “[...] correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, [...]” (2º§)
- E) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento [...]” (1º§)

**Questão 06**

Sobre o emprego da linguagem utilizada no texto, pode-se afirmar que tal escolha tem como objetivo:

- A) Alcançar interlocutores de todos os níveis sociais de modo a divulgar e ofertar o conhecimento explorado.
- B) Valorizar as variadas linguagens e suas expressões utilizando uma linguagem universal que abrange todas as outras.
- C) Contribuir para conferir legitimidade às informações e ideias apresentadas, atendendo às expectativas do público a que se destina.
- D) Fortalecer o vínculo entre enunciador e leitor, à medida que é empregada uma linguagem informal e acessível ao grande público.
- E) Atender aos interesses específicos de leitores que tenham o “Direito” como principal interesse em relação às áreas do conhecimento.

**Questão 07**

Considerando-se as relações anafóricas estabelecidas no texto e sua importância para a continuidade das ideias apresentadas, assinale a alternativa que indica corretamente o referente correspondente ao termo destacado.

- A) “[...] que, calamitosa, agravou-se [...]” (1º§) / calamitosa
- B) “[...] que demanda comprometimento também dos homens [...]” (1º§) / ela
- C) “A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, [...]” (3º§) / situação
- D) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, [...]” (1º§) / violência contra a mulher
- E) “Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras [...]” (2º§) / pesquisa visível e invisível

**Questão 08**

O texto expõe duas situações que se relacionam no cenário apresentado: a violência contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus. Em relação ao citado anteriormente, de acordo com o texto pode-se afirmar que:

- I. Há uma relação de causa e consequência estabelecida entre as situações apresentadas.
- II. Tanto uma situação quanto a outra são questões graves e vistas como tipos de pandemias, ainda que diferentes.
- III. A pandemia do novo coronavírus tornou a violência doméstica, até então silenciosa, exposta em sua totalidade e gravidade à sociedade.
- IV. Chegou-se à conclusão de que a pandemia do novo coronavírus foi fator fundamental para o estabelecimento da violência contra a mulher.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e III.
- E) II, III e IV.

**Questão 09**

Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e o seu complemento em “*Esses números correspondem a informações [...]*” (2º§), indique a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado.

- A) À apresentação iremos todos.
- B) Ao documento a diretora solicitou.
- C) Abraçou sua esposa como se fosse a primeira vez.
- D) É preciso ter respeito ao cumprimento das normas.
- E) Li-as completamente, todas as páginas do relatório.

**Questão 10**

Pode-se afirmar que o texto apresenta como ponto de vista defendido:

- A) O agravamento da pandemia do novo coronavírus.
- B) O aumento das múltiplas violências contra a mulher em vários segmentos sociais.
- C) A constatação da redução da violência nas ruas em meio à pandemia do novo coronavírus.
- D) Números e percentuais correspondentes à realidade de violências e agressões sofridas por mulheres em 2020.
- E) A necessidade do envolvimento de outro segmento da sociedade além das mulheres no que diz respeito à violência cometida contra elas.

**RACIOCÍNIO LÓGICO**

**Questão 11**

Para organizar o depósito de uma grande indústria farmacêutica, o administrador contratou um operador de empilhadeira para realizar 40 demandas. Para cada demanda efetuada de maneira correta, o operador recebe R\$ 60,00 e, se uma demanda é efetuada erroneamente, o operador deve pagar R\$ 30,00. Considerando que o operador recebeu R\$ 1.050,00 após o serviço prestado, o número de demandas realizadas corretamente é:

- A) 24
- B) 25
- C) 26
- D) 27
- E) 28

**Questão 12**

Os 44 dentistas de uma cidade foram questionados se concluíram os cursos de especialização em ortodontia, implantodontia e traumatologia. Considere que todos os dentistas têm, pelo menos, uma das especializações citadas. Alguns dos resultados da pesquisa estão descritos a seguir; analise-os.

- 28 dentistas fizeram a especialização em ortodontia;
- 4 dentistas fizeram apenas a especialização em ortodontia;
- 1 dentista fez apenas a especialização em traumatologia;
- 21 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e implantodontia;
- 11 dentistas fizeram as especializações de implantodontia e traumatologia; e,
- 13 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e traumatologia.

De acordo com as informações anteriores, é correto afirmar que:

- A) 16 dentistas fizeram a especialização em traumatologia.
- B) 15 dentistas fizeram somente a especialização em implantodontia.
- C) Nenhum dentista fez apenas as especializações em traumatologia e implantodontia.
- D) 10 dentistas fizeram as especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.
- E) 30 dentistas fizeram pelo menos duas das especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.

**Questão 13**

No feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos e 6 enfermeiros farão plantão em um centro de saúde. Se certo procedimento necessitar de 2 médicos e 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas?

- A) 30
- B) 60
- C) 90
- D) 120
- E) 180

**Questão 14**

Uma pesquisa foi conduzida em uma amostra de 220 profissionais da saúde para investigar se houve um aumento de insônia durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). A tabela apresenta o resultado da pesquisa:

Sexo	Aumento de Insônia	
	Sim	Não
Masculino	46	82
Feminino	38	54

Considere os eventos:

- $X$ : selecionar uma mulher dentre todos os profissionais da saúde entrevistados;
- $Y$ : selecionar um homem dentre os profissionais da saúde entrevistados que tiveram aumento de insônia; e,
- $Z$ : selecionar um profissional da saúde que não teve aumento de insônia dentre as mulheres entrevistadas.

Sobre a probabilidade (P) de ocorrência de cada um dos eventos anteriores, é correto afirmar que:

- A)  $P(X) < P(Y) < P(Z)$
- B)  $P(X) < P(Z) < P(Y)$
- C)  $P(Y) < P(X) < P(Z)$
- D)  $P(Z) < P(Y) < P(X)$
- E)  $P(Z) < P(X) < P(Y)$

**Questão 15**

O número de processos ético-profissionais julgados em um Conselho Regional de Medicina no dia útil  $X$  de um determinado mês é dado pelo valor da função  $f(x) = -x^2 + 12x - 27$ , em que  $x = 1, 2, \dots, 20$ . Os dias úteis em que houve julgamentos são aqueles que satisfazem  $f(x) > 0$ . Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir.

- I. Em apenas 9 dias úteis desse mês houve julgamentos de processos ético-profissionais.
- II. O maior número de processos ético-profissionais julgados em um mesmo dia é 6.
- III. No oitavo dia útil desse mês, há uma redução no número de processos ético-profissionais julgados com respeito ao sétimo dia útil.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) II.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II e III.

**Questão 16**

Adriana, Bárbara e Camila trabalham em um mesmo centro de saúde e exercem as profissões de cardiologista, ginecologista e médica da família, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a cardiologista é a mais velha das três profissionais da saúde. Além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologia. Adriana, que não é a médica da família, é mais nova que Bárbara. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- A) Bárbara é cardiologista.
- B) Adriana é ginecologista.
- C) Camila é a médica da família.
- D) Camila é a mais nova das três profissionais de saúde.
- E) Bárbara é a mais velha das três profissionais de saúde.


**Questão 17**

Os funcionários de um laboratório de análises clínicas se reuniram para comprar um presente para o diretor no valor de R\$ 120,00, que será dividido igualmente entre eles. Por questões pessoais, 4 funcionários desistiram de participar da compra do presente e foi necessário acrescentar R\$ 5,00 no valor que seria pago por cada um dos funcionários restantes. Quantas pessoas contribuíram para a compra do presente?

- A) 8
- B) 10
- C) 12
- D) 14
- E) 16

**Questão 18**

O terreno de um pronto atendimento está representado na imagem pelo retângulo PQRS. O trapézio sombreado é destinado à recepção e triagem dos pacientes e, por exigências locais, deve ocupar uma área de, no mínimo, 30% e, no máximo, 60% da área total desse pronto atendimento. Além disso, sabe-se que  $PQ = 25$  m;  $QU = 22$  m; e,  $UR = 28$  m.



Se o segmento ST possui X metros, todos os valores possíveis de X devem satisfazer:

- A)  $2 \leq x \leq 24$
- B)  $2 \leq x \leq 32$
- C)  $18 \leq x \leq 32$
- D)  $24 \leq x \leq 36$
- E)  $24 \leq x \leq 48$

**Questão 19**

Na maternidade de determinado hospital, trabalham 55 enfermeiros. Em cada jornada de trabalho são escalados 20 enfermeiros para a execução das tarefas diárias. A administradora do hospital decidiu ofertar um curso de qualificação a todos os profissionais desse setor. Qual o número mínimo de enfermeiros que deverão fazer o curso de qualificação, para que em cada jornada de trabalho haja pelo menos um enfermeiro qualificado?

- A) 20
- B) 25
- C) 26
- D) 35
- E) 36

**Questão 20**

Após um grande incêndio em um prédio residencial, M moradores foram internados no mesmo dia no hospital mais próximo ao local do acidente. Uma semana após o incêndio, 12 moradores tiveram alta. Na segunda semana, um terço dos moradores restantes no hospital foram liberados. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda restavam no hospital tiveram alta. Sabendo-se que ainda havia 18 moradores internados, qual o valor de M?

- A) 40
- B) 48
- C) 54
- D) 66
- E) 84

**NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA**

**Questão 21**

O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) tem como competências, EXCETO:

- A) Manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão institucional.
- B) Assegurar aos gestores do SUS e órgãos congêneres o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- C) Definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia e metodologia de informática em saúde, sob a coordenação do Secretário-Executivo.
- D) Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e desenvolvimento do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério.
- E) Desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação de informações necessárias às ações de saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde.

**Questão 22**

Segundo tal Princípio, “a saúde é um direito de todos e é um dever do Poder Público a provisão de serviços e de ações que lhe garanta, colocando também o desafio de oferta de serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos”. Trata-se do Princípio da:

- A) Equidade.
- B) Integralidade.
- C) Universalidade.
- D) Hierarquização.
- E) Regionalização.

**Questão 23**

“O Art. 7º da Lei nº 8.080/1990 afirma que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com \_\_\_\_\_ previstos(as) no Art. 198 da Constituição Federal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) as diretrizes
- B) os princípios
- C) as atribuições
- D) as organizações
- E) as competências

**Questão 24**

O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por alguns princípios e diretrizes que são: universalidade, integralidade, equidade, regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Define corretamente o conceito de equidade:

- A) Organizar recursos e serviços oferecidos pelo SUS de acordo com as necessidades de cada caso atendido.
- B) Organizar serviços que fazem parte do SUS com o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível.
- C) Proporcionar acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade, sendo tal direito garantido a todas as pessoas.
- D) Diminuir a desigualdade oferecendo atendimentos personalizados em que os pacientes possam ser atendidos conforme as suas necessidades específicas.
- E) Ver o paciente como um todo, implementando atendimento que considere diversos aspectos, pela integração de tratamentos e atendimentos com diferentes profissionais da saúde.

**Questão 25**

A Portaria nº 1.660/2009 institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS), no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo:

- A) Propor e/ou executar estudos ou pesquisas de interesse nacional.
- B) Identificar e divulgar sinais e/ou alertas relativos às notificações, quando cabível.
- C) Auxiliar os profissionais da saúde, prestando informações sobre a segurança na utilização dos produtos e serviços.
- D) Monitorar, analisar e investigar os eventos adversos e as queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso.
- E) Propor parâmetros de implantação do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária para a formalização dos Planos de Ação Anuais dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

**Questão 26**

Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de dados em informação. Para profissionais da saúde, o envolvimento na construção de instrumentos de coletas, treinamentos para captação correta dos dados e processamento da informação são importantes, uma vez que possibilitam maior domínio desta área do conhecimento. O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) mantém à disposição todos os SIS em uso no Brasil, sendo possível captar informações a respeito de, EXCETO:

- A) Indicadores de Saúde.
- B) Condições de trabalho e situação de emprego no Brasil.
- C) Epidemiologia e morbidade (morbidade hospitalar do SUS, doenças de notificação, estado nutricional e demais agravos).
- D) Assistência à Saúde (internação hospitalar, produção ambulatorial, imunização, saúde da família, vigilância alimentar e nutricional).
- E) Rede Assistencial (informações do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) Estatísticas Vitais (natalidade, mortalidade, câncer).

**Questão 27**

Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e a organização do sistema de saúde em nosso país, sendo a base legal do SUS constituída, fundamentalmente, por três documentos que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro; analise-os.

- I. A Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência e da assistência social.
- II. A Lei nº 8.080/1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe, principalmente, sobre a organização e a regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional.
- III. A Lei nº 8.142/1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

**Está correto o que se afirma em**

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

**Questão 28**

A Política Nacional de Vigilância em Saúde juntamente com a Política Nacional de Atenção Básica preconizam a integração entre as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica como fator essencial para o atendimento das reais necessidades de saúde da população, sendo o trabalho conjunto entre os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) estratégico e desejável para identificar e intervir nos problemas de saúde-doença da comunidade, facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir doenças. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal nº 13.595/2018, são consideradas atribuições dos ACEs, EXCETO:

- A) Registrar informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS.
- B) Desenvolver ações de mobilização na comunidade relativas ao tratamento de doenças e agravos à saúde.
- C) Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças.
- D) Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com os ACSs e as equipes de Atenção Básica.
- E) Divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção coletivas e individuais.

**Questão 29**

**Entende-se corretamente por vigilância epidemiológica:**

- A) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.
- B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores.
- C) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- D) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- E) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

**Questão 30**

O Pacto pela Saúde é resultado de um esforço das esferas municipal, estadual e federal para, em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Seu objetivo principal é avançar na implantação dos princípios constitucionais referentes à saúde. Os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde em 2006, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas em alguns componentes; assinale-os.

- A) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS; e, Pacto de Gestão do SUS.
- B) Pacto da Reforma Sanitária; Pacto de Promoção à Saúde; e, Pacto pela Vida.
- C) Pacto de Gestão do SUS; Pacto pela Vida; e, Pacto de Planejamento e Regionalização.
- D) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa da Cidadania; e, Pacto de Planejamento e Regionalização.
- E) Pacto em Defesa do SUS; Pacto de Planejamento; e, Regionalização e Pacto da Reforma Sanitária.

**Questão 31**

AC, sexo feminino, 25 anos, deseja ser orientada a respeito da prevenção do câncer de colo uterino. O médico informa sobre a necessidade da realização do exame Papanicolaou. Tal procedimento pode ser considerado como prevenção:

- A) Primária.
- B) Secundária.
- C) Terciária.
- D) Quartenária.
- E) Não pode ser considerado prevenção, pois é um exame diagnóstico.

**Questão 32**

Assinale, a seguir, a alternativa que pode ser considerada na medicina preventiva como prevenção terciária.

- A) Reabilitação pós-AVC.
- B) Campanhas de vacinação.
- C) Realização de mamografia.
- D) Rastreio de câncer de próstata.
- E) Campanhas de conscientização sobre obesidade.

**Questão 33**

EF, sexo feminino, 15 anos, procura atendimento médico pois iniciou a vida sexual com seu namorado e deseja receber informações sobre contracepção. Diante da situação hipotética, o médico deverá:

- A) Orientar a paciente sobre os métodos existentes; e, de acordo com a vontade da mesma, lhe prescrever o mais adequado.
- B) Acionar o conselho tutelar e a assistente social, pois, considerando que a paciente tem menos de 16 anos, o caso se enquadra como estupro de vulnerável.
- C) Orientar a paciente que, por ser menor de idade, não poderá receber prescrição de contracepção sem estar acompanhada de um dos pais ou responsáveis.
- D) Orientar a paciente sobre os métodos existentes; e, de acordo com a vontade da mesma, lhe prescrever o mais adequado. Porém, os pais devem ser comunicados por escrito da prescrição.
- E) Orientar a paciente que poderá usar qualquer método contraceptivo, com exceção dos métodos de longa duração, como DIU e implante subdérmico, pois só estão autorizados para maiores de 18 anos.

**Questão 34**

Determinado médico deseja prescrever para seu paciente, com 50 kg, uma medicação anti-hipertensiva por via endovenosa disponível em uma ampola de 5 mL contendo 5 mg/mL. Para isso, dilui uma ampola em 245 mL de soro glicosado a 5%. A dose desejada da medicação é de 0,5 mcg/kg/min. Qual deverá ser, em mL/h, a velocidade de infusão da solução em BIC?

- A) 1 mL/hora
- B) 5 mL/hora
- C) 10 mL/hora
- D) 15 mL/hora
- E) 25 mL/hora

**Questão 35**

LDF, 70 anos, chega ao pronto-socorro trazido pelos familiares após ser encontrado em casa com rebaixamento do nível de consciência. É realizada uma tomografia de crânio que evidencia grande sangramento intraparenquimatoso com desvio considerável da linha média. O paciente evolui, desfavoravelmente, necessitando de intubação orotraqueal. Sobre a comunicação de más notícias, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A linguagem deverá ser direta e clara, evitando vocabulário extremamente técnico ou rebuscado, objetivando a compreensão e o entendimento do familiar.
- B) O médico deverá procurar saber o que os familiares entendem do quadro e, independente da vontade da família, informar a situação detalhada e completa do paciente.
- C) O familiar deve receber o tempo adequado para compreender o quadro do paciente para, então, posteriormente, poder discutir questões como a abordagem terapêutica.
- D) Quando a proposta terapêutica é paliativa, é de fundamental importância o entendimento da família, para evitar a não compreensão do propósito do manejo e a superestimação de sua eficácia.
- E) O médico deverá sempre procurar um local adequado, reservado, onde não haja interrupções; se for de preferência do familiar, deve autorizar um acompanhante para poder comunicar as más notícias.

**Questão 36**

**Um paciente que pesa 100 kg e mede 1,80 m pode ser classificado, de acordo com seu IMC, em qual grau de obesidade?**

- A) Sobrepeso.
- B) Peso normal.
- C) Obesidade grau I.
- D) Obesidade grau II.
- E) Obesidade grau III.

**Questão 37**

**Paciente, 25 anos, vai ao médico da empresa em que trabalha após ter realizado exame diagnóstico positivo para HIV. Relata ter iniciado novo relacionamento há dois meses e teme que o diagnóstico prejudique sua relação com a parceira. Diante da situação hipotética, o médico deverá:**

- A) Notificar a assistente social e as autoridades policiais, pois ocultar tal diagnóstico da parceira configura crime.
- B) Respeitar a decisão do paciente de não comunicar a parceira, visto que sempre deve ser respeitado o sigilo médico.
- C) Comunicar imediatamente a parceira, independentemente de o paciente decidir lhe transmitir a notícia, pois ele poderá desistir de contá-la.
- D) Orientar o paciente que deve comunicar a parceira. Caso não o faça, o médico deverá tomar medidas para convocá-la e comunicar a notícia.
- E) Orientar o paciente que deve comunicar a parceira. Caso não o faça, deverá convocá-la, assim como também deverá notificar a empresa onde o paciente trabalha, pois trata de uma doença altamente transmissível no ambiente laboral.

**Questão 38**

**João, 25 anos, homem trans, vem à consulta em unidade básica de saúde em seu bairro para consulta de rotina. Sobre o atendimento adequado à população transgênero, assinale a afirmativa INCORRETA.**

- A) Caso o paciente tenha práticas sexuais que possam resultar em gravidez indesejada, pode-se oferecer contracepção.
- B) As unidades de saúde devem exigir que o nome social do paciente esteja retificado em cartório, assim também como o gênero, para que o mesmo seja chamado por ele.
- C) A colpocitologia oncótica deve ser oferecida a todas as pessoas entre 25 e 65 anos que possuem colo do útero e que já tiveram algum tipo de penetração vaginal ao longo da vida.
- D) O cuidado deve ser sempre centrado na pessoa atendida; portanto, suas percepções, necessidades e desejos devem ser compreendidos e a construção do plano terapêutico precisa ser compartilhada com o paciente.
- E) O médico deve atuar pelo conforto da pessoa explicando qualquer procedimento antes de realizá-lo, elucidar dúvidas e compreender quais termos são melhores aceitos pelo paciente para tratar de partes do seu corpo.

**Questão 39**

**Considerando o que dispõe o Novo Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2.217/2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019, assinale a afirmativa correta.**

- A) Os Conselhos de Medicina exercem tanto o papel de disciplinadores quanto de julgadores da classe médica.
- B) O Novo Código de Ética Médica foi elaborado a partir das decisões da II Conferência Nacional de Ética Médica realizada em 2008.
- C) O médico portador de doença grave fica impedido do exercício da profissão enquanto perdurarem as limitações de sua capacidade física.
- D) O Novo Código de Ética Médica busca o melhor relacionamento entre o médico e seu paciente, prescindindo da autonomia de vontade deste.
- E) As regras deontológicas de ética médica destinam-se ao exercício da profissão clínica, não se aplicando às atividades de ensino e pesquisa.

**Questão 40**

**De acordo com o Novo Código de Ética Médica, quanto aos princípios fundamentais, assinale a afirmativa correta.**

- A) O aprimoramento contínuo dos conhecimentos é um dever ético, assim como o uso do melhor progresso científico.
- B) A autonomia ética sempre autoriza a recusa do médico a atender determinados pacientes por razões de índole pessoal.
- C) O dever ético da atuação médica limita-se ao evento morte do paciente, devendo-se guardar sigilo a respeito das informações do prontuário.
- D) A medicina somente pode ser exercida como comércio nos limites e circunstâncias expressamente previstos do Código de Ética Médica.
- E) O médico não se limitará a disposições estatutárias ou regimentais de hospital ou instituição pública ou privada, ainda que benéficas ao paciente.

Considere o caso clínico a seguir para responder às questões 41 e 42. Leia-o atentamente.

“Paciente, 48 anos, sexo masculino, tem queixa de dor epigástrica em queimação, refratária ao tratamento clínico com omeprazol e medidas dietéticas e comportamentais. Foi submetido à endoscopia digestiva alta, evidenciando úlcera única em região pré-pilórica. A úlcera foi biopsiada, sendo descartado o diagnóstico de neoplasia gástrica. Optou-se por tratamento cirúrgico da úlcera, devido à refratariedade ao tratamento clínico.”

### Questão 41

De acordo com a classificação de *Johnson*, a úlcera apresentada pelo paciente deve ser classificada como:

- A) Tipo I.
- B) Tipo II.
- C) Tipo III.
- D) Tipo IV.
- E) Tipo V.

### Questão 42

Das cirurgias relacionadas, a mais adequada para o caso é a gastrectomia:

- A) Subtotal com reconstrução à *Billroth* II.
- B) Distal (antrectomia) com reconstrução à *Billroth* I.
- C) Distal (antrectomia) com reconstrução em Y de *Roux*.
- D) Subtotal com reconstrução em Y de *Roux* + vagotomia troncular.
- E) Distal (antrectomia) com reconstrução à *Billroth* I + vagotomia troncular.

As informações contextualizam as questões 43 e 44. Leia-as atentamente.

“Em 2015 ocorreu um *workshop* intitulado ‘Estratificação de risco e individualização do cuidado da hipertensão portal’, onde foram traçadas as diretrizes do *Baveno* VI. Os principais pontos de discussão foram o uso de métodos invasivos e não invasivos para o rastreamento e vigilância das varizes gastroesofágicas e da hipertensão portal, o impacto do tratamento do fator etiológico na cirrose, prevenção primária da descompensação, manejo do episódio de sangramento agudo e prevenção de recorrência de hemorragia.”

### Questão 43

Considerando o contexto, analise as afirmativas seguir.

- I. A elastografia hepática transitória é suficiente para se suspeitar de doença hepática crônica avançada compensada em pacientes assintomáticos com causas conhecidas de doença hepática crônica.
- II. Define-se por hipertensão portal clinicamente significativa os níveis de gradiente de pressão da veia hepática superiores a 10 mmHg.
- III. Os métodos invasivos deverão ser aplicados quando o diagnóstico da doença hepática crônica for duvidoso, ou em caso de necessidade de testes confirmatórios, sendo eles: endoscopia digestiva alta com pesquisa de varizes; biópsia hepática; quantificação de colágeno por histologia; e, medida do gradiente de pressão da veia hepática.

De acordo com as recomendações da *Baveno* VI, está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

### Questão 44

“No manejo do sangramento digestivo agudo varicoso, no momento pré-endoscopia digestiva alta, foi acordado o uso de \_\_\_\_\_, com o objetivo de aumentar a visibilidade durante a endoscopia, bem como reduzir a necessidade da realização de segundo exame para conclusão diagnóstica e/ou terapêutica.” Assinale a medicação que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) octreotide
- B) bromoprida
- C) pantoprazol
- D) eritromicina
- E) metoclopramida

**Questão 45**

Paciente, 18 anos, sexo masculino, foi vítima de acidente moto x automóvel há uma hora. Após avaliação inicial, foi constatado que o paciente apresenta neurotrauma exclusivo. Foi submetido à tomografia computadorizada de crânio, sendo diagnosticado hematoma subdural à esquerda. Neste tipo de lesão, a principal origem do sangramento é:

- A) Veias em ponte.
- B) Veia meníngea média.
- C) Artéria meníngea média.
- D) Artéria cerebral anterior.
- E) Artéria meníngea superior.

**Questão 46**

Paciente, sexo masculino, 77 anos, diabético, tem queixa de dor abdominal de início em fossa ilíaca esquerda, que se tornou difusa. Relata dez dias de evolução. Ao exame: regular estado geral; febril, desidratado 1+/4+; frequência cardíaca 100 bpm; pressão arterial: 100 x 70 mmHg. TC de abdômen e pelve com contraste: achados sugestivos de diverticulite aguda com borramento de mesentério. Após tratamento inicial adequado, paciente evoluiu com piora clínica e sinais de peritonite difusa ao exame clínico. Foi submetido à laparotomia exploradora, em que foi constatada peritonite purulenta difusa. De acordo com a classificação de *Hinchey*, o paciente apresenta diverticulite estágio:

- A) I
- B) IIa
- C) IIb
- D) III
- E) IV

O caso clínico a seguir contextualiza as questões 47 e 48. Leia-o atentamente.

“Paciente, sexo feminino, 28 anos, assintomática, hígida, sem uso de medicações, apresentou achado incidental de nódulo hepático de 3,0 cm em ultrassonografia de abdômen superior, inconclusivo ao método. O exame foi realizado, pois a paciente quis realizar um ‘check-up’ com o médico de sua família. Para melhor detalhamento do nódulo, foi solicitada tomografia computadorizada de abdômen e pelve com contraste, o qual evidenciou: nódulo de 28 mm de diâmetro em segmento hepático II, de aspecto homogêneo, com rápida captação de contraste na fase arterial com a presença de uma cicatriz central hipodensa (em ‘roda de carruagem’).”

**Questão 47**

Considerando o contexto, o diagnóstico mais provável para o caso é:

- A) Hepatocarcinoma.
- B) Adenoma hepático.
- C) Carcinoma fibrolamelar.
- D) Hemangioma cavernoso.
- E) Hiperplasia nodular focal.

**Questão 48**

Considerando a principal hipótese diagnóstica, a conduta recomendada para o caso é:

- A) Conservadora.
- B) Hepatectomia direita.
- C) Hepatectomia esquerda.
- D) Segmentectomia do segmento II.
- E) Biópsia guiada por ultrassonografia.

**Questão 49**

Paciente, sexo feminino, 25 anos, realizou ultrassonografia da glândula tireoide porque estava com medo de ser portadora de alguma neoplasia, assim como sua mãe. A paciente não tem queixas; os exames laboratoriais TSH; T4 total; T4 livre; T3; e, tireoglobulina são normais. O exame de ultrassom tem como conclusão do laudo: nódulo de 20 mm; com vascularização central ao Doppler; além de microcalcificações; e, localizado em lobo tireoidiano direito. Considerando o caso clínico, o diagnóstico mais provável para tal paciente é:

- A) Bócio uninodular atóxico.
- B) Hiperplasia nodular focal.
- C) Carcinoma medular de tireoide.
- D) Carcinoma folicular de tireoide.
- E) Carcinoma papilífero de tireoide.

**Questão 50**

Paciente, sexo masculino, 49 anos, foi submetido há seis dias à gastrectomia total com reconstrução em Y de Roux para tratamento de adenocarcinoma gástrico. No momento está assintomático; porém, iniciou drenagem de secreção biliar pelo dreno abdominal. Ao exame: bom estado geral; eupneico; hidratado; abdômen flácido; indolor; ferida operatória em bom aspecto; e, dreno com conteúdo bilioso. FC: 95 bpm; PA: 140 x 80 mmHg. Laboratório: Hb: 12,0g/dL; Leucócitos 13.000; sem desvio; e, PCR 20,0 (referência 5,0). A principal hipótese diagnóstica e a conduta recomendada são, respectivamente:

- A) Fístula de coto duodenal; tratamento conservador.
- B) Fístula de coto duodenal; laparotomia exploradora.
- C) Lesão iatrogênica de via biliar; laparotomia exploradora.
- D) Fístula da gastroenteroanastomose; tratamento conservador.
- E) Fístula da gastroenteroanastomose; laparotomia exploradora.

O caso clínico a seguir contextualiza as questões 51 e 52. Leia-o atentamente.

“Paciente, sexo feminino, 30 anos, realizou ultrassonografia de tireoide após sua médica ter palpado nódulo no local. O ultrassom revelou nódulo sólido, isoecoico, de 18 mm, sem vascularização pelo *Doppler*, localizado em lobo direito. Foi então indicada Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF), que teve como conclusão do laudo: nódulo *Bethesda III*.”

**Questão 51**

Assinale a alternativa que melhor descreve o significado do achado na PAAF.

- A) Maligno.
- B) Nódulo benigno.
- C) Amostra não diagnóstica.
- D) Suspeito para malignidade.
- E) Lesão folicular de significado indeterminado.

**Questão 52**

De acordo com as orientações do consenso brasileiro sobre nódulo tireoidiano e câncer diferenciado de tireoide, qual a conduta recomendada considerando-se o resultado da PAAF?

- A) Lobectomia direita.
- B) Repetir a PAAF imediatamente.
- C) Repetir a PAAF em doze meses.
- D) Repetir a PAAF em três a seis meses.
- E) Repetir a ultrassonografia imediatamente.

**Questão 53**

Paciente, sexo masculino, 22 anos, tem diagnóstico de hérnia inguinal direita indireta sintomática. Será submetido à herniorrafia em hospital que não dispõe de tela de polipropileno. Na escolha da técnica cirúrgica, o cirurgião optou por realizar a sutura do músculo transverso do abdômen e da aponeurose do músculo oblíquo interno no ligamento inguinal, de forma a fechar o local de protrusão da hérnia. A técnica cirúrgica realizada é chamada de:

- A) *Bassini*.
- B) *McVay*.
- C) *Shouldice*.
- D) *Lichtenstein*.
- E) *Zimmermann*.

**Questão 54**

Paciente, sexo masculino, 32 anos, foi vítima de atropelamento por carro há duas horas. Chega ao pronto-socorro trazido pelos bombeiros. Ao exame: via aérea pérvia, com colar cervical; eupneico; MV presentes e simétricos; sem estigmas de trauma torácico; FR: 26; SatO<sub>2</sub>: 99%; FC: 150 bpm; PA: 76 x 50 mmHg; abdômen com múltiplas escoriações e equimoses; rígido; doloroso difusamente; descompressão brusca positiva; toque retal sem alterações; exames laboratoriais: Hb: 9,0 g/dL; Leucócitos: 8.000 µL; Plaquetas: 250.000; Creatinina: 0,7; Na: 140 mmol/L; K: 4,0 mmol/L; Lactato 35 mmol/L (referência < 2 mmol/L); e, pH 7,27 (arterial). De acordo com as recomendações do *Advanced Trauma Life Support (ATLS 10)* sobre o uso do ácido tranexâmico (transamin) em paciente vítimas de politrauma, NÃO é considerado um critério na indicação do seu uso:

- A) Nível do pH.
- B) Frequência cardíaca.
- C) Pressão arterial sistólica.
- D) Tempo decorrido do trauma.
- E) Presença de lesão com hemorragia não compressível.

**Questão 55**

Paciente, 60 anos, sexo feminino, etilista, hipertensa e diabética, procura pronto-socorro devido a aumento do volume abdominal e náuseas. Durante o exame físico suspeitou-se da presença de ascite, a qual foi confirmada por ultrassonografia. Como se tratava de seu primeiro episódio de ascite, foi submetida à paracentese diagnóstica. Considerando que o gradiente de albumina soroscite (GASA) foi alto ( $> 1,1$ ), NÃO se espera que a etiologia da ascite seja:

- A) Cirrose hepática.
- B) Hepatite alcoólica.
- C) Ascite cardiogênica.
- D) Peritonite tuberculosa.
- E) Síndrome de *Budd-Chiari*.

**Questão 56**

As hérnias inguinais diretas são aquelas secundárias a um processo de fraqueza da parede abdominal, geralmente se exteriorizando pelo triângulo de *Hasselbach*. Compõem os limites deste triângulo:

- A) Músculo oblíquo externo; ligamento inguinal; e, fáscia transversal.
- B) Músculo reto abdominal; ligamento inguinal; e, vasos ilíacos externos.
- C) Músculo oblíquo interno; músculo reto abdominal; e, ligamento inguinal.
- D) Músculo reto abdominal; ligamento inguinal; e, vasos epigástricos inferiores.
- E) Músculo reto abdominal; ligamento pectíneo; e, artéria epigástrica superficial.

**Questão 57**

Paciente, sexo masculino, 60 anos, recebeu o diagnóstico de hepatocarcinoma, devido à cirrose hepática alcoólica. O paciente preenche critérios para cirurgia curativa e será submetido a uma hepatectomia direita clássica. Nesta cirurgia, podemos afirmar que os segmentos ressecados são:

- A) II e III.
- B) I, II e III.
- C) I, II, III e IV.
- D) V, VI, VII e VIII.
- E) IV, V, VI, VII e VIII.

**Questão 58**

Paciente, sexo masculino, 18 anos, sem comorbidades, vítima de atropelamento com ônibus há duas horas, sendo levado ao pronto-socorro pelos bombeiros. No momento, o paciente encontra-se instável hemodinamicamente, com diversas lacerações torácicas e abdominais, além de fratura de fêmur bilateral. Considerando as alterações endócrino-metabólicas induzidas pelo trauma, NÃO é esperada a ocorrência de:

- A) Redução da insulina.
- B) Aumento do cortisol.
- C) Redução da aldosterona.
- D) Aumento das catecolamina.
- E) Aumento da gliconeogênese.

**Questão 59**

Homem, 65 anos de idade, foi diagnosticado com adenocarcinoma gástrico e será submetido à gastrectomia total com reconstrução em Y de *Roux*. Segundo o seu potencial de contaminação, esta cirurgia é classificada como:

- A) Suja.
- B) Limpa.
- C) Infectada.
- D) Contaminada.
- E) Potencialmente contaminada.

**Questão 60**

Paciente, sexo masculino, 62 anos, tabagista, foi submetido à Endoscopia Digestiva Alta (EDA) durante investigação epigástrica. Na EDA, identificou-se lesão ulcerada com margens bem demarcadas, bordas elevadas, sem sinais de infiltração. A úlcera foi biopsiada e o anatomopatológico confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma gástrico. Segundo a classificação de *Borrmann* para câncer gástrico, tal lesão é categorizada como do tipo:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

**Questão 61**

Os adenocarcinomas gástricos podem ser divididos em dois principais tipos, segundo a classificação de *Lauren*: intestinal e difuso. A respeito das particularidades de cada um deles, assinale a afirmativa correta.

- A) Difuso: acomete, preferencialmente, pacientes do sexo feminino.
- B) Difuso: está mais associado à atrofia gástrica e metaplasia epitelial.
- C) Intestinal: se dissemina, preferencialmente, pela via hematogênica.
- D) Intestinal: tem como peculiaridade no anatomopatológico a presença de células em anel de sinete.
- E) Intestinal: acomete, preferencialmente, um grupo etário mais jovem, enquanto o difuso tende a acometer a população idosa com mais frequência.

**Questão 62**

O câncer de esôfago é uma neoplasia maligna caracterizada por dois grandes tipos histológicos: adenocarcinoma e carcinoma epidermoide. Sobre estes tipos, assinale a afirmativa correta.

- A) Adenocarcinoma: está mais associado ao tabagismo.
- B) Adenocarcinoma: apresenta forte associação com acalasia.
- C) Adenocarcinoma: acomete, preferencialmente, homens brancos.
- D) Carcinoma epidermoide: localiza-se, geralmente, no terço distal do esôfago.
- E) Síndrome De Plummer-Vinson: está mais associada ao adenocarcinoma de esôfago.

**Questão 63**

Paciente, 30 anos, sexo masculino, foi vítima de queda a cavaleiro. Relata que estava em cima do telhado, caindo com a região perineal em muro. Apresenta dor perineal, sangramento uretral e massa perineal palpável. Considerando o mecanismo de trauma, a região da uretra mais comumente acometida nestes casos é a:

- A) Bulbar.
- B) Peniana.
- C) Prostática.
- D) Membranosa.
- E) Semimembranosa.

**Questão 64**

Paciente, sexo masculino, 65 anos, com câncer de esôfago avançado, vem apresentando dificuldade progressiva de alimentação e, atualmente, consegue ingerir apenas dieta líquida. No momento encontra-se em regular estado geral, desnutrido, com IMC 14,0 Kg/m<sup>2</sup>. Foi internado para tentativa de tratamento da desnutrição. Caso a realimentação seja realizada de forma acelerada, os distúrbios eletrolíticos esperados são:

- A) Hipofosfatemia; hipomagnesemia; e, hipocalemia.
- B) Hipofosfatemia; hipermagnesemia; e, hipocalemia.
- C) Hiperfosfatemia; hipomagnesemia; e, hipocalemia.
- D) Hipofosfatemia; hipermagnesemia; e, hipercalemia.
- E) Hiperfosfatemia; hipermagnesemia; e, hipercalemia.

**Questão 65**

A síndrome de *Lynch* é uma doença autossômica dominante associada a mutações na linhagem germinativa nos genes do Sistema *Mismatch Repair* de reparo do DNA, sendo responsável por, aproximadamente, 5% de todos os casos de câncer colorretal. Os critérios para o diagnóstico clínico de tal síndrome foram estabelecidos em 1990 (Critérios de Amsterdam I) e atualizados em 1999, quando foram definidos os critérios de Amsterdam II. Considerando o exposto, analise as afirmativas a seguir.

- I. Três ou mais familiares com neoplasia associada à síndrome de *Lynch* (câncer colorretal ou câncer de endométrio; intestino delgado; estômago; hepatobiliar; de pelve renal; e, ureter), sendo um parente de 1º grau dos outros dois.
  - II. Famílias com casos de câncer colorretal em, no mínimo, duas gerações.
  - III. Famílias com um ou mais casos de câncer colorretal diagnosticados antes dos 50 anos de idade.
  - IV. Presença de câncer colorretal sincrônico ou metacrônico, ou outro tumor do espectro *Lynch*, independentemente da idade.
- São considerados critérios diagnósticos de Amsterdam II para o diagnóstico da síndrome de *Lynch* apenas o que se afirma em

- A) I e III.
- B) II e III.
- C) I, II e III.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

**Questão 66**

Paciente, 69 anos, sexo feminino, foi diagnosticada com prolapso total do reto. O cirurgião responsável pelo caso optou por realizar a retossigmoidectomia perineal, na qual o reto e o sigmoide prolapsados, em conjunto com seus mesos, são removidos por via perineal; a fibrose decorrente deste procedimento fixa o reto na pele. Tal técnica é chamada, classicamente, de cirurgia de:

- A) Wells.
- B) Mikulicz.
- C) Thiersch.
- D) Delorme.
- E) Altemeier.

**Questão 67**

Paciente, 62 anos, sexo feminino, multigesta, hipertensa, recebeu o diagnóstico de incontinência fecal significativa. Foi indicado tratamento cirúrgico pela técnica de Parks. Assinale a alternativa que melhor descreve tal cirurgia.

- A) Retossigmoidectomia, com anastomose colorretal baixa.
- B) Esfincteroplastia através da sobreposição dos cabos musculares rompidos.
- C) Levantamento retrorretal transanal do cólon seguido de colostomia perineal.
- D) Levantamento retrorretal transanal do cólon seguido de colostomia abdominal.
- E) Posicionamento de tela anteriormente ao reto, sendo fixada no promontório sacral.

**Questão 68**

Considerando o tratamento cirúrgico da doença hemorroidária que deve ser oferecido, principalmente, aos pacientes com persistência dos sintomas após tratamento clínico ou conservador, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) A técnica fechada mostrou-se mais eficaz em reduzir a dor pós-operatória, apesar de um tempo de cicatrização mais longo.
- ( ) Além da vantagem do tempo operatório mais curto associado à técnica fechada, esta se mostrou menos dolorosa no período pós-operatório precoce.
- ( ) A hemorroidectomia sem a utilização do bisturi elétrico está associada a menos dor no pós-operatório, menor tempo de cicatrização e menor ocorrência de complicações precoces e tardias.

De acordo com as recomendações da Diretrizes sobre o tratamento cirúrgico da doença hemorroidária, da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a sequência está correta em

- A) F, F, F.
- B) V, F, F.
- C) V, V, F.
- D) F, F, V.
- E) F, V, V.

O caso clínico a seguir contextualiza as questões 69 e 70. Leia-o atentamente.

“Paciente, sexo masculino, 68 anos, com cirrose hepática de etiologia alcoólica, apresenta ascite há seis meses. No momento evoluiu com dor abdominal difusa, febre e leucocitose, sendo feita hipótese diagnóstica de Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE).”

**Questão 69**

São considerados os principais micro-organismos associados à PBE em pacientes com cirrose hepática:

- A) *Klebsiella pneumoniae* e *Escherichia coli*.
- B) *Staphylococcus aureus* e *Escherichia coli*.
- C) *Escherichia coli* e *Streptococcus pneumoniae*.
- D) *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus pyogenes*.
- E) *Klebsiella pneumoniae* e *Pseudomonas aeruginosa*.

**Questão 70**

Com a realização do tratamento adequado, a paciente terá alta hospitalar. Visando à profilaxia de novos episódios de PBE, qual o antibiótico de escolha?

- A) Cefotaxima.
- B) Ceftriaxona.
- C) Norfloxacin.
- D) Amoxicilina + Clavulanato.
- E) Sulfametoxazol + Trimetoprima.

**Questão 71**

A terapia antimicrobiana é uma das bases do tratamento de pacientes com colecistite aguda. Os *Guidelines de Tóquio 2018 (TG18)* fornecem recomendações para o uso apropriado dos antimicrobianos nestes pacientes. De acordo com as recomendações de tal *Guideline (TG18)*, após a colecistectomia em pacientes com colecistite aguda grau I, a terapia antimicrobiana pode ser descontinuada em:

- A) < 24 horas.
- B) 5 dias.
- C) 7 dias.
- D) 10 dias.
- E) 14 dias.

O caso clínico a seguir contextualiza as questões **72** e **73**. Leia-o atentamente.

“As neoplasias císticas do pâncreas têm adquirido importância crescente devido ao acesso e aprimoramento das técnicas diagnósticas, principalmente tomografia computadorizada e ressonância magnética. A confirmação diagnóstica geralmente é difícil, ficando algumas lesões sem definição mesmo após análise histopatológica.”

**Questão 72**

Sobre a neoplasia cística mucinosa do pâncreas, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- ( ) Acomete, preferencialmente, a população do sexo masculino.
- ( ) Localiza-se mais comumente na cabeça pancreática.
- ( ) Na análise do líquido cístico, espera-se elevação da amilase e do CA 19-9.

A sequência está correta em

- A) F, F, F.
- B) V, F, F.
- C) F, V, F.
- D) V, F, V.
- E) F, V, V.

**Questão 73**

Sobre as lesões císticas pancreáticas, assinale a afirmativa correta.

- A) O cistoadenoma seroso tem alto potencial de malignidade.
- B) A maioria dos pacientes com neoplasia mucinosa papilar intraductal são sintomáticos.
- C) Na ecoendoscopia, o cistoadenoma seroso tem um clássico padrão microcístico em “favo de mel”.
- D) A presença de icterícia obstrutiva em paciente com lesão cística na cabeça do pâncreas é sugestiva de benignidade.
- E) A neoplasia mucinosa papilar intraductal do tipo ducto secundário tem maior risco de malignidade do que o tipo ducto principal.

**Questão 74**

A classificação de *Siewert* é empregada em adenocarcinomas da junção esofagogástrica; apresenta grande utilidade para guiar a conduta cirúrgica. De acordo com as orientações do II Consenso Brasileiro de Câncer Gástrico, nos adenocarcinomas tipo *Siewert* III, a cirurgia de escolha é:

- A) Esofagectomia total e confecção de tubo gástrico.
- B) Gastrectomia total com esofagectomia distal e reconstrução em Y de *Roux*.
- C) Gastrectomia subtotal com esofagectomia distal e reconstrução em Y de *Roux*.
- D) Esofagectomia transmediastinal com gastrectomia proximal e confecção de tubo gástrico.
- E) Esofagectomia transtorácica (toracoscopia) com gastrectomia proximal e confecção de tubo gástrico.

**Questão 75**

Paciente, sexo feminino, 30 anos, gestante de 26 semanas, comparece ao pronto-socorro com quadro de dor abdominal difusa, de início há um dia, associado a náuseas e febre. Apresenta leucocitose e elevação da proteína C reativa. A principal causa não obstétrica de cirurgia em pacientes gestantes com abdômen agudo é:

- A) Ureterolitíase.
- B) Colecistite aguda.
- C) Apendicite aguda.
- D) Diverticulite aguda.
- E) Aderência intestinal.

**Questão 76**

A cirurgia bariátrica pode ser dividida em três principais grupos: restritivas, disabsortivas e mistas. Diversas técnicas podem ser utilizadas visando este fim. Assinale, a seguir, a alternativa que melhor descreve a cirurgia de *Scopinaro*.

- A) Bandagem gástrica ajustável.
- B) Gastroplastia vertical com bandagem.
- C) Derivação biliopancreática com gastrectomia horizontal.
- D) Derivação gástrica em Y de *Roux* sem anel de contenção.
- E) Derivação biliopancreática com gastrectomia vertical e preservação pilórica.

**Questão 77**

Considerando que o triângulo de *Calot* é um importante marco cirúrgico a ser identificado durante uma cirurgia de colecistectomia videolaparoscópica, podemos afirmar que seus limites são:

- A) Ducto colédoco; ducto cístico; e, lobo hepático direito.
- B) Ducto cístico; ducto colédoco; e, ducto hepático comum.
- C) Ducto cístico; ducto hepático direito; e, lobo hepático direito.
- D) Ducto cístico; ducto hepático comum; e, lobo hepático direito.
- E) Ducto colédoco; ducto hepático comum; e, ducto hepático direito.

**Questão 78**

Paciente, sexo feminino, 45 anos de idade, apresenta hérnia femoral esquerda sintomática. De acordo com a classificação de *Nyhus* para hérnias inguinofemorais, tal paciente é categorizada como:

- A) Tipo I.
- B) Tipo II.
- C) Tipo IIIA.
- D) Tipo IIIC.
- E) Tipo IV.

O caso clínico a seguir contextualiza as questões 79 e 80. Leia-o atentamente.

“A colangite aguda é uma infecção da árvore biliar potencialmente fatal se não diagnosticada e tratada rapidamente.”

**Questão 79**

De acordo com as orientações dos *Guidelines de Tóquio 2018 (TG18)*, são considerados critérios diagnósticos para colangite aguda, EXCETO:

- A) Febre.
- B) Elevação da proteína C reativa.
- C) Episódio prévio de colangite aguda.
- D) Dilatação da via biliar em exame de imagem.
- E) Aumento da TGO; TGP; fosfatase alcalina; e, Gama GT.

**Questão 80**

De acordo com as orientações dos *Guidelines de Tóquio 2018 (TG18)*, são critérios de gravidade para colangite aguda grau III (grave), EXCETO:

(Considere: PaO<sub>2</sub>: pressão parcial de O<sub>2</sub> no sangue arterial; e, FiO<sub>2</sub>: fração de oxigênio no ar inspirado.)

- A) Idade > 75 anos.
- B) Creatinina > 2.0 mg/dl.
- C) Relação PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> < 300.
- D) Plaquetas < 100.000/mm<sup>3</sup>.
- E) Alteração no nível de consciência.

**ATENÇÃO**



**NÃO É PERMITIDA** a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.  
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.



## INSTRUÇÕES

**É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.**

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos – ainda que terapêuticos – e/ou similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
4. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos.
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação.
6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.
8. Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de Inscrição ou em qualquer outro meio.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir das 3 horas após o início de sua realização; contudo, não poderá levar consigo o seu Caderno de Provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.

## RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br), a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas objetivas de múltipla escolha.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br).
- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br), no *link* correspondente ao Concurso Público.